


Siomptóim COVID-19 do shuíomhanna Feighlíochta Leanaí



Coróinvíreas
COVID-19
Comhairle
Sláinte Poiblí

Leis an méadú reatha i gcásanna de COVID-19 chomh maith le hionfhabhtuithe eile mar RSV agus an fliú, ba cheart go mbeadh Feighlithe Leanaí aireach go háirithe faoi na siomptóim COVID-19 agus tinnis riospráide eile. Má thagann aon cheann de na siomptóim thíos ort, níor cheart duit an suíomh a fheidhmiú, beag beann ar thástáil dhiúltach COVID-19 go dtí go mbeidh tú saor ó ghéarshiomptóim ar feadh 48 uair an chloig fiú má tá na siomptóim éadrom.

I measc na siomptóim is coitianta a bhaineann le COVID-19, tá:

- fiabhras (teocht ard 38 céim Celsius nó os a chionn)
- casacht thirim
- traochadh (tuirse)

I measc na siomptóim nach bhfuil chomh coitianta sin, tá:

- caillteanas nó athrú bolaidh nó blaiste – d'fhéadfadh go gciallóidh sé seo go bhfuil siad imithe go hiomlán nó díreach difriúil ó mar a bhíonn siad de ghnáth
- plúchadh sróine (srón ag sileadh nó srón phlúchta)
- toinníteas
- scornach thinn
- tinneas cinn
- pian sna matáin nó sna hailt (tinnis agus pianta)
- cineálacha éagsúla grís craicinn
- samhnas nó urlacan
- buinneach
- crithfhuacht nó meadhrán

B'fhéidir nach mbeadh na siomptóim seo go léir ort, agus d'fhéadfadh go mbeadh na siomptóim éagsúil le cineálacha éagsúla de COVID-19, d'fhéadfadh go dtógfadh sé suas le 14 lá sula bhfeictear siomptóim freisin.

Is féidir le siomptóim COVID-19 a bheith cosúil le siomptóim shlaghdáin, fliú nó fiabhras léana. Má tá amhras ort faoi aon siomptóim atá ort, cuir glao ar do dhochtúir ginearálta.

Víreas Sincítiach Riospráide (RSV)

Is víreas riospráide séasúrach é RSV a mbíonn siomptóim beagnach comhionann le COVID-19 mar thoradh air. Tá leanaí óga san ospidéal faoi láthair de dheasca RSV. Níor chóir d'fheighlithe leanaí a bhfuil siomptóim orthu atá mar an gcéanna le siomptóim RSV a suíomhanna a fheidhmiú, beag beann ar thástáil dhiúltach COVID-19, go dtí go mbeidh na siomptóim imithe tar éis 48 uair an chloig, ar mhaithe le folláine na leanaí óga atá faoina gcúram.

Is measc na siomptóim is coitianta a bhaineann le RSV, tá; srón ag sileadh, casacht, sraothartach, fiabhras agus cársánach.



An Roinn Leanaí, Comhionannais,
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige
Department of Children, Equality,
Disability, Integration and Youth